


THC DROPS STENOCARE



STYRKE:

25 mg/ml THC og mindre end 2 mg/ml CBD

INDHOLD/FLASKE:


1000 mg THC og 80 mg CBD

PAKNING:

40 ml oral opløsning per 60 ml flaske

CANNABIS TYPE:

Indica



THC DROPS STENOCARE

Total terpene indhold: 0,85 mg/ml

Bar grafen er opdelt så den proportionalt viser indhold i forhold til det totale indhold af terpenener. Tal er angivet som procentvis værdi.

40 ml oral THC-opløsning cannabis ekstrakt er en opløsning i neutral bæreeolie til 25 mg/ml styrke.

Det er en doseringsvenlig oral opløsning. Apoteket udleverer med hver flaske en 1 ml oral doseringsprøjte. Doseringsprøjten er forsynet med angivelse af intervaller på 0,1 ml. En 1 ml opløsning indeholder 25 mg cannabinoider, som er 'aktiverede' til optagelse og virkning hos patienten. THC DROPS STENOCARE indtages oralt ved placering under tungen.

Produktet er fremstillet af tørrede cannabis blomster, som ved en efterfølgende varmebehandling og ekstraktionsproces udvinder de naturlige aktivstoffer. THC DROPS STENOCARE har deklareret indhold af cannabinoiderne THC og CBD (jf. www.Medicinlisten.dk). Ekstraktet indeholder også andre naturlige aktivstoffer som terpenener (jf. illustration).

THC DROPS STENOCARE er såkaldt "fuld spektret", hvilket vil sige, at det indeholder alle de naturligt forekommende cannabinoider, terpenener og flavonoider fra planten.

Det indeholder ekstrakt af Cannabis sativa L. ssp. indica 'Sensi Star', flos (cannabisblomst) svarende til 25 mg dronabinol (THC) og under 2 mg cannabidiol (CBD). Ekstraktionsmiddel: Kuldioxid

DOSERING

Introduktion for nye brugere af THC DROPS STENOCARE medicinsk cannabis oliepræparat

Dosering er individuel for alle mennesker. Det anbefales at man starter med en lav dosis, og venter minimum fire timer før yderligere indtag af THC DROPS STENOCARE. Hvis en højere dosis er nødvendig kan dosis evt øges i trin til den ønskede effekt opnås. Begynd med lav dosis, og øg langsomt dosis efter effektskalaen til ønskede effekt er opnået. Effekten mærkes efter 30-90 minutter efter indtagelse. Den maksimale effekt mærkes efter 2-3 timer. Effekten vil vare 4-8 timer.

EFFEKTSKALA		Oral indtagelse
Effekt mærkes		30 – 90 minutter
Fuld effekt mærkes		2 – 3 timer
Varighed af effekt		4 – 8 timer